

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-06

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-13

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Perkutant transhepatiskt dränage (PTD) - kontroll

Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare.

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention Bild och funktionsmedicin, Skövde för undersökning, procedur för kontroll av PTD (Perkutan Transhepatisk Dränage).

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare skall utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning: [hybridsal, – arbetsbeskrivning interventionssjuksköterska, undersköterska](#)

Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention, Bild och funktionsmedicin radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

Utrustning

Mediel Celex

Siemens Artis Pheno.

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

Utförande

PTC med externt dränage kontroll efter intervention eller annat ingrepp.

PTC med internt dränage kontroll efter intervention eller annat ingrepp.

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undersökningsrum: | SKASS GML2/GML1 SKASS OPHYB7/ OPHYB8. |
| Patientförberedelse på avdelningen: | Transport i säng. |
| Patientinformation/ Förberedelse på lab: | Placera patienten i ryggläge. Armstöd med trycksårsprofylaxkuddar sätts på plats. |
| Material: | Bordsduk (stor). 2 st 20 ml spruta. 1 st 10 ml spruta. Uppdragningskanyl. Etiketter. |
| Dokumentation i Melior: | Öppna upp mallen ”Rtg: intervention” i Melior och fyll i protokollet och signera. |
| Positionering av Pheno: | Bordet vinklat till 0 grader. Patienten liggande Head first – Supine. Röntgenröret ska vara inställt på Left side. Styrkonsol på höger sida om patienten Läkaren och assisterande sjuksköterska på patientens högra sida. |
| Läkemedel: | NaCl 10 ml. |
| Kontrastmedel: | Visipaque 270 mgI/ml (50 ml). |
| Dokumentation/ Programval: | PTD. |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektion: | Frontal. |
| Dokumentation i PACS: | Enstaka bilder. Dokumentation av kontrastmedel och mängd. PTC med externt dränage kontroll efter intervention eller annat ingrepp 490 608. PTC med internt dränage kontroll efter intervention eller annat ingrepp 491 608. |

Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

Arbetsgrupp

IVC processen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-403

Version: 10.0

Giltig från: 2026-03-06

Giltig till: 2028-03-13