

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-10-23

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-12-07

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Buk med iv och peroral kontrast 840B - datortomografi

Syfte

Metodbeskrivning av utförande av datortomografiundersökning
840B buk med iv kontrast i portovenösfas.

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid. Anpassad efter ny mall. Kilovolt/kontrast
anpassad undersökning (AutoP)

Metodmall

Us kod/Us namn

840 801 / DT buk med iv och peroral kontrast

Indikation

Abscess-infektion. Bred tumörutredning.

Serieöversikt

Scout	Frontal och sida
Serie 1.	Buk med iv och peroralt kontrastmedel i portovenös fas

Förberedelser

- ID kontroll skall utföras på undersökningsrum.
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras
- Kontrollera kreatinin och beräkna GFR.
- PVK, central veninfart (helst rosa).
- Inneliggande patienter: Peroral kontrast: 1000 ml 2 %
Omnipaque 300 mgI/ml 2 timmar innan undersökningen.
Polikliniska patienter: Peroral kontrast 1000 ml vatten 2

timmar innan undersökningen om inte annat står på remissen. Glöm inte att ge sista kontrasten/vattnet på bordet.

- Innan undersökningen tillfrågas fertila kvinnor (15–50 år) om eventuell graviditet. Om gravid: kontakta ansvarig radiolog som tillsammans med remittent gör en individuell bedömning om undersökningen är berättigad

Patientpositionering

Ryggläge, fötterna först, armarna ovan huvud

Bilderna tas vid inandning. Gärna kudde under knäna.

Patientcentrering

XY Centrera xifoideus /bröstbensspetsen

Kontrastmedel

Omnipaque 350 mgI/ml. Barn Visipaque 270 mgI/ml.

Kontrastprotokoll

SkaS Buk rutin 120kV alternativt 100kV.

Anpassa dosen enligt vikt och vald kV i Omnijekt.

Detta är ett Kilovolt anpassat protokoll (AutoP).

Max vikt Män 90kg/ Kvinnor 80kg.

Ingen väger mindre än 60kg (gäller endast vid bra GFR).

Barn: Visipaque 270mgI/ml, 2ml per kg kroppsvikt 35sek inj tid

Omnijekt	120kV	100kV
mgI/kg kroppsvikt	500mgI/kg	400mgI/kg

Injektionstid

35 sekunder

Kontrastfördröjning

Monitorering (smart prep) ROI i aorta HU 150 + 50s (ca 75–80 s fördröjning)



DFOV

Efter bukens yttre begränsningar.

Scout

Lateral och frontal

Scanområde/kriterier

Smart prep	Serie 1. Med kontrast i portovenös fas
ROI i aorta descendens i diafragmanivå	Genom hela buken: första bilden strax ovan diafragma, sista bilden nedom ramus inferior.
	

Dokumentation

Dokumentera i RIS enligt rutin. Om kriterier inte uppnås för undersökningen ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.



Strålskydd

Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion.

Rekonstruktioner

Serie	Recon nr		Snittjocklek/ intervall	Algoritm	Fönstersättning	Arkivering
Scout						PACS
1. Buk +K TS	1		0,6/alt,5mm	Standard	400/40	
Buk +K TS TF	2	copy	0,6//0,6	Standard T	400/40	PACS/AW server
Buk +K Bone TS	3	copy	0,6/0,6	Bone	2500/500	AW server
*MAR Buk +K TS TF	4	man	0,6/0,6	Standard T	400/40	PACS/AW server
Dosrapport						PACS

Reformateringar

			Projektion Cor 3mm Sag 3mm	Görs med automatik
---	--	---	----------------------------------	--------------------

Serie	Auto/ Man	MPR	Snittjocklek / Intervall	Fönstersättning	Algoritm	Arkivering
Buk +K TS TF	Auto	cor	3/3	400/40	standard	PACS
Buk +K TS TF	Auto	sag	3/3	400/40	standard	PACS

Hängningsprotokoll

Buk +K TS TF	Cor 3mm	Dosrapport	
Sag 3mm	Scout		

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-71

Version: 9.0

Giltig från: 2025-10-23

Giltig till: 2027-12-07