

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-11-19

Innehållsansvar: Alexandra Forssgren, (aleja), Processchef

Giltig till: 2027-11-19

Godkänd av: Alexandra Forssgren, (aleja), Processchef

Postoperativa sårinfektioner - hudsjukvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Syfte

Handläggning av postoperativa sårinfektioner på Hudkliniken SkaS

Arbetsbeskrivning

Handläggning av postoperativa sårinfektioner på Hudkliniken SkaS

(baserat på Information från Läkemedelsverket, 5: 2009, framtaget i samarbete med STRAMA)

Efter ren kirurgi är stafylokocker vanligaste fynden. Gramnegativ flora och anaerober förekommer efter potentiellt kontaminerad kirurgi.

Sårinfektion bör misstänkas vid kvarstående sekretion flera dagar (5 - 10) postoperativt, oftast i kombination med svullnad, rodnad, värmeökning och värk.

Infektionen öppnas genom att suturer avlägsnas i infekterat område.

För djupa infektioner och abscesser gäller incision och dränage.

Odlingsprov tages.

Antibiotika är endast indicerat vid

- Incision
- Vid mer omfattande infiltration i operationsområdet med feber och allmänpåverkan

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Alexandra Forssgren, (aleja), Processchef

Godkänd av: Alexandra Forssgren, (aleja), Processchef

Dokument-ID: SKAS9705-2111586895-10

Version: 7.0

Giltig från: 2025-11-19

Giltig till: 2027-11-19