

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-04-28

Innehållsansvar: Daniel Hellner, (danhe), Överläkare

Giltig till: 2027-04-28

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Verapamil (Isoptin) vid takykardi - kardiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, Syfte och mål

Isoptin (Verapamil) är ett Licenspreparat som kan ges vid förmakstakyarytmi, AV-nodala takyarytmi, idiopatisk kammartakykardi (RVOT VT, LVOT VT och fascikulära VT).

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Beredningsform:

Injektionslösning 2,5 mg/ml

Dosering:

5 mg (2 ml = 1 Ampull)

Hantering:

Ges långsamt som intravenös injektion, under 2-3 minuter.

Dosen kan upprepas efter 5-10 minuter, och i allmänhet är detta tillräckligt för att uppnå terapeutisk effekt.

Observation / Övervakning:

Noggrann kontroll av blodtryck och EKG under och efter injektion

Arbetsgrupp

Arytmteamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Daniel Hellner, (danhe), Överläkare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-100

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-28

Giltig till: 2027-04-28