

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2024-09-09

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2026-09-09

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Antikoagulationsbehandling inför koronarangiografi med ev PCI - kardiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Risken för tromboemboliska komplikationer bedöms större vid utsättning av antikoagulantia än risken för betydelsefulla blödningar med bibehållen behandling.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Antikoagulationsbehandling inför koronarangiografi/PCI

Vid koronarangiografi/PCI på patient som behandlas med Waran eller NOAK bibehålls denna behandling i samband med ingreppet, oavsett orsak till antikoagulationsbehandlingen.

Vid Waranbehandling eftersträvas PK-värde under 3,0. PK kontrolleras på Hjärtmottagningen i samband med förberedande besök där, alternativt på avdelningen om patienten är inneliggande.

Enstaka undantag från ovanstående kan förekomma i samband med särskilt komplicerade

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

PCI-ingrepp, AK-behandlingen hanteras då enligt särskilda instruktioner av PCI-operatören.

Arbetsgrupp

PCI-teamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-31

Version: 5.0

Giltig från: 2024-09-09

Giltig till: 2026-09-09