

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2026-06-11

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2028-06-11

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

# Antikoagulationsbehandling inför koronarangiografi med ev PCI - kardiologi

Förändringar sedan föregående version  
Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Risken för tromboemboliska komplikationer bedöms större vid utsättning av antikoagulantia än risken för betydelsefulla blödningar med bibehållen behandling.

## Arbetsbeskrivning

*Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.*

## **Antikoagulationsbehandling inför koronarangiografi/PCI**

Vid koronarangiografi/PCI på patient som behandlas med Waran eller DOAK bibehålls denna behandling i samband med ingreppet, oavsett orsak till antikoagulationsbehandlingen.

Vid Waranbehandling eftersträvas PK-värde under 3,0. PK kontrolleras på Hjärtmottagningen i samband med förberedande besök där, alternativt på avdelningen om patienten är inneliggande.

Enstaka undantag från ovanstående kan förekomma i samband med särskilt komplicerade

PCI-ingrepp, AK-behandlingen hanteras då enligt särskilda instruktioner av PCI-operatören.

## Arbetsgrupp

PCI-teamet, kardiologkliniken SkaS Skövde

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Maria Stolt Toremark, (marst34),  
Specialsjuksköterska

**Granskad av:** Erik Frick, (erifr), Processchef

**Godkänd av:** Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9709-121726567-31

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-06-11

**Giltig till:** 2028-06-11