

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-04-15

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-04-15

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Carbocain – Adrenalin (Mepivacain) s.c. - kardiologi

Förändringar sedan föregående version
Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Sivande/sipprande blödning (venös) efter artärpunktion i arteria femoralis.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Instrumentdragande sjuksköterska med personlig delegering administrerar Carbocain/Adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml.

1. Aspiration av sprutan innan injektion för att utesluta artärpunktion.
2. 0,5-1 ml injiceras/infiltreras s.c runt stickkanalen följt av några minuters manuell kompression.

Arbetsgrupp

PCI-teamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34),
Specialsjuusköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-39

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2027-04-15