

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-05-20

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-05-20

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Fondaparinux (Arixtra) - kardiologi

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Används för att förhindra koagulationsfaktor Xa "tio-A" från att verka i blodet och förhindrar på så sätt oönskade blodproppar. Har samma effekt som Klexane men betydligt mindre blödningsproblematik. Risken halverad i den stora OASIS-5 studien.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Administrering

- Förfylld spruta 2,5 mg/0,5 ml.
- Ges subcutant en gång per dygn, och som injiceras vid ungefär samma tidpunkt varje dag.
- Arixtra ges snarast efter att indikation konstaterats.
- Arixtra ges ej om PCI planeras inom 4 timmar.

Observera

Dosreduktion måste ske vid nedsatt njurfunktion. Arixtra är kontraindicerat vid kreatininclearance (GFR) under 20 ml/min. Dosen halveras vid GFR mindre än 30 och ingen behandling om under 20. GFR-beräkning ska göras vid hög ålder (>80), låg vikt (<50) och om S-kreatinin över 120.

Läkemedlets utseende

Antitrombosmedel, lösning, förfylld spruta. Lösningen är en klar och färglös vätska.

Vanliga biverkningar

- Blödning t ex. befintligt magsår eller näsblod
- Anemi

Formel för beräkning av GFR, kreatininclearance

Män: $(140 - \text{ålder}) \times \text{vikt i kg} \times 1,23 / \text{S-kreatinin}$

Kvinnor: $(140 - \text{ålder}) \times \text{vikt i kg} \times 1,04 / \text{S-kreatinin}$

Inj 1			
Dag 1 kl:	inj. 2	inj. 3	inj. 4
00	Dag 1 kl: 20	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20
01	Dag 1 kl: 21	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20
02	Dag 1 kl: 22	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20
03	Dag 1 kl: 23	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20
04	Dag 2 kl: 00	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
05	Dag 2 kl: 09	Dag 3 kl: 13	Dag 4 kl: 20
06	Dag 2 kl: 10	Dag 3 kl: 14	Dag 4 kl: 20
07	Dag 2 kl: 11	Dag 3 kl: 15	Dag 4 kl: 20
08	Dag 2 kl: 12	Dag 3 kl: 16	Dag 4 kl: 20
09	Dag 2 kl: 13	Dag 3 kl: 17	Dag 4 kl: 20
10	Dag 2 kl: 14	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
11	Dag 2 kl: 15	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
12	Dag 2 kl: 16	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
13	Dag 2 kl: 17	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
14	Dag 2 kl: 18	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
15	Dag 2 kl: 19	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
16	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
17	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
18	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
19	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
20	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
21	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
22	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20
23	Dag 2 kl: 20	Dag 3 kl: 20	Dag 4 kl: 20

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-54

Version: 8.0

Giltig från: 2025-05-20

Giltig till: 2027-05-20