

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-04-28

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-04-28

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Heparin vid perkutan koronarintervention, PCI - kardiologi

Revideringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Vid PCI kan Heparin användas som antikoagulatium.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

-Vid PCI kan Heparin användas som antikoagulatium.

-Doseringen är viktberoende, 70-100 U/kg.

-Dosen beräknas av PCI-operatören och administreras via introducern alt intravenöst.

Dokumentation

Given dos skrivs i Meliors läkemedelsmodul, i ordinationsmall, av PCI-sjuksköterska.

ACT

Mäts 10 minuter efter given dos, därefter var 30:e minut.

Eventuellt extra dos ordineras av PCI-operatören.

ACT bör ligga kring 250 sek under proceduren.

Eftervård

Angioseal:

Sängläge i 4 timmar om Heparin givits (efter 2 timmar kan huvudändan på

sängen höjas 450) och därefter kan patienten komma upp (om ingen aktiv blödning i ljumske uppkommit).

Introducer kvar i ljumske:

Dragning av introducer när ACT < 180 sek (av ssk med särskild delegering) och därefter sänkläge och femostopp enligt styrdokument.

Arbetsgrupp

PCI-teamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-57

Version: 7.0

Giltig från: 2025-04-28

Giltig till: 2027-04-28