

Gäller för: VE Akutmott Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur Gastro, M2 gamla VE

Giltig från: 2025-12-30

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-12-30

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Koronarangiografi med eventuell PCI-återtransport

Revideringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Syfte

Förtydligande av kriterier för när patient kan transporteras tillbaka till hemsjukhus efter genomgången koronarangiografi/PCI.

Arbetsbeskrivning

Beställ transport snarast då patienten återkommer till avdelningen. Liggande sjuktransport får ej bytas ut mot bårtaxi. Följ riktlinjer nedan. Patienter räknas som samtransportabla då de bedöms kunna ligga på flersal.

Efter koronarangiografi utan kranskärlsförändringar:

Patienten kan åka tillbaka samma dag i liggande sjuktransport utan övervak.

Efter koronarangiografi med kranskärlsförändringar - Ej åtgärdad med PCI:

Patient åker med ambulans och med övervak samma dag.

Efter PCI-behandling:

Patienten transporteras åter i ambulans med EKG-övervak så snart patienten är smärtfri och hemodynamiskt stabil, även med pågående TR-band. Däremot skall kompression av instickställe med Femostop vara avslutat. Patientens behov av övervakning bör bedömas av läkare innan transport.

Arbetsgrupp

PCI-teamet SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Akutmott Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur
Gastro, M2 gamla VE

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34),
Specialsjuusköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-70

Version: 8.0

Giltig från: 2025-12-30

Giltig till: 2027-12-30