

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Lisa Brandin, (lisbr3), Överläkare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03

Val av diabetesläkemedel vid hjärtsjukdom - kardiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet. Ändat SGTL-2 till SGTL-2h, samt justerat rutan under Stroke/PAD.

Lagt flödesschemat som länk.

Bakgrund, syfte och mål

Behandling med SGLT-2h eller GLP-1 analog till patient med diabetes typ2 och samtidig hjärt-kärlsjukdom har visats minska risken för död och återinsjuknande i hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Medicineringen bör övervägas oavsett HbA1c nivå. Om patienten står på insulin kan insulindosen behöva justeras.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Länk: [Flödesschema](#)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Lisa Brandin, (lisbr3), Överläkare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-909276518-105

Version: 3.0

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03