

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-12-22

Innehållsansvar: Maria Ström, (marst22), Sektionsledare

Giltig till: 2027-12-22

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Mannitol, förberedelser

Revideringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Undersöka graden av över-retbarhet i luftvägarna för att fastställa astmadiagnos.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Utförande

Patienten andas in ett läkemedel (Aridol) och får därefter blåsa ut ett snabbt andetag. Detta upprepas flera gånger med ökande mängder enligt ett standardiserat protokoll.

Förberedelser

Patienten ska vara rökfri 6 timmar innan undersökningen. Ingen hård fysisk aktivitet. Undvika större mängder av koffeinhaltiga drycker (kaffe, te eller cola) och livsmedel (ex choklad) som innehåller koffein samma dag som testet görs.

Vid pågående luftvägsinfektion eller nyligen (inom 3 veckor) genomgången luftvägsinfektion vänligen tag **kontakt med oss** före undersökningen

Mediciner

Inga inhalationsläkemedel under 24 timmar före undersökningen med undantag av snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel som ej får tas 6 timmar före undersökningen:

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ventoline, Airomir, Buventol, Ventilastin

Övriga mediciner tas som vanligt.

Medtag medicinlista om det finns.

Undersökningstid

Cirka 60-75 minuter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Ström, (marst22), Sektionsledare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9711-355354010-15

Version: 8.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22