

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Ström, (marst22), Sektionsledare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-27

Giltig till: 2027-08-27

Metakolintest, förberedelser

Revideringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Att undersöka överretbarheten i luftvägarna (bronkiell hyperreaktivitet).

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Utförande

Patienten andas in upprepade doser av ett läkemedel som kan reta luftrören till sammandragning om patientens luftvägar är överretbara. Patienten får blåsa ut ett snabbt andetag efter varje dos för att se om luftrören påverkas.

Förberedelser

Patienten skall vara rökfri 6 timmar före undersökningen.

Vid pågående luftvägsinfektion eller nyligen (inom 3 veckor) genomgången luftvägsinfektion vänligen tag **kontakt med oss** före undersökningen.

Mediciner

Inga inhalationsläkemedel under 24 timmar före undersökningen med undantag av snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel som ej får tas 6 timmar före undersökningen:

Ventoline, Airomir, Buventol, Ventilastin

Övriga mediciner tas som vanligt.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Medtag medicinlista om det finns.

Undersökningstid

Cirka 1½ timma.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Ström, (marst22), Sektionsledare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9711-355354010-16

Version: 7.0

Giltig från: 2025-08-27

Giltig till: 2027-08-27