

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Ström, (marst22), Sektionsledare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Capsaicin, förberedelser

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Undersöka graden av överkänslighet för dofter och kemikalier.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Utförande

Patienten kommer att få andas in små mängder Capsaicin, ett ämne som ingår i chili/spansk peppar och som irriterar host-receptorer. Antalet hoststötar räknas och utgör mått på graden av känslighet i de sensoriska nerverna i luftvägarna.

Förberedelser

Patienten ska vara rökfri 6 timmar före undersökningen.

Vid pågående luftvägsinfektion eller nyligen (inom 3 veckor) genomgången luftvägsinfektion var vänlig tag kontakt med oss före undersökningen.

Mediciner

Inga inhalationsläkemedel under 24 timmar före undersökningen med undantag av snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel som ej får tas 6 timmar före undersökningen:

Ventoline, Airomir, Buventol, Ventilastin

Övriga mediciner tas som vanligt.

Medtag medicinlista om det finns.

Undersökningstid

Cirka 60 minuter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Ström, (marst22), Sektionsledare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9711-355354010-4

Version: 9.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22