OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE Kir Uro Pall Onkologi
Innehållsansvar: Ruji-On Namnuan, (ruona1), Överläkare
Godkänd av: Jenny Berg, (jenbe), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-27
Giltig till: 2028-07-27

Operation av förhudsförträngning

Förändringar sedan föregående version

Uppdatering och förlängd giltighet.

Bakgrund och syfte

Operationskrävande fimosis kan åtgärdas på såväl urologmottagning som operationsavdelning. Operation på urologmottagning innebär ofta ökad tillgänglighet samt undvikande av preoperativa förberedelser som långvarig fasta. Operation av fimosis bör därför rutinmässigt planeras för åtgärd på urologmottagningen om inga kontraindikationer föreligger.

Förutsättningar

Ingreppet genomförs i lokal anestesi med penisblockad utan möjlighet till sedering. Denna anestesimetod lämpar sig framförallt på vuxna patienter utan uttalad kognitiv svikt. Patienter som bedöms vara i behov av sedering såsom pediatriska patienter bör åtgärdas på operationsavdelning.

Förberedelser

Uppehåll av antikoagulantia och NOAK enligt rekommendationer för elektiv kirurgi. Vid behandling med dubbel trombocythämmare ska uppehåll av ett läkemedel göras 5 dagar innan operation. Diskussion med ansvarig förskrivare görs vid behov.

Utförande

Patienter med operationskrävande fimosis ska huvudsakligen erbjudas åtgärd på mottagningen. Anmälan av operation kan göras utifrån remissbedömning eller läkarbesök. Utöver operationsindikation ska ställningstagande till preoperativ utsättning av antikoagulantia eller trombocythämmare göras. Patienten ska även vara lämplig för enbart lokal anestesi utan möjlighet till sedering.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Gul besökslapp för urologmottagningens tidsbokning ifylles. Tidsåtgång bedöms vara 60 minuter. Skriftlig information utgår till patienten tillsammans med kallelse.
Patienter som inte bedöms lämpliga för operation på mottagningen ska operationsanmälas i Orbit enligt tidigare rutin. Hit hör exempelvis pediatriska patienter och patienter med kognitiv svikt.

Relaterad information

Länkar: Postoperativ patientinformation circumcision, plastik och adherenslösning.
Plocklista fimosisoperation på mottagning.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kir Uro Pall Onkologi

Innehållsansvar: Ruji-On Namnuan, (ruona1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Berg, (jenbe), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-140

Version: 8.0

Giltig från: 2026-07-27

Giltig till: 2028-07-27