

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wårme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-16

Giltig till: 2027-05-12

# Koloskopi och invasiv gynundersökning vid peritonealdialys (PD) - njursjukvård

## Förändringar sedan föregående version

Ändring av innehållsansvarig och tillägg av arbetsgrupp

## Syfte

Beskriva rutin inför koloskopi eller invasiv instrumentell gynekologisk procedur för att förebygga peritonit.

## Arbetsbeskrivning

### Normalrutin:

Inför **koloskopi** förses patienten med:

1 tablett Trimetoprim/sulfametoxazol 800 mg/160 mg + 3 tabletter Metronidazol 400 mg,

Undersökningen utförs med urtappad PD-vätska.

Inför **invasiva eller instrumentella gynekologiska procedurer** såsom hysteroscopi, endometriebiopsi och abrasio mm förses patienten med:

1 tablett Trimetoprim/sulfametoxazol 800 mg/160 mg, 2 timmar före undersökningen.

Undersökningen utförs med urtappad PD-vätska.

**Referens:** ISPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment.

**Samråd** avseende ab-val utifrån ett svenskt perspektiv med överläkare, docent Gunnar Jacobsson, Infektionskliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde / Strama VGR / Terapigrupp Infektion/LK VGR

## Arbetsgrupp

Maria Johansson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde.

Lukas Sjöberg, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde.

Ann Karlsson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde.

Åsa Andersson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

**Granskad av:** Anna Wärme, (annwa49), Processchef

**Godkänd av:** Andreas Lestander Melin, (andle15),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9715-1834850575-161

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-05-16

**Giltig till:** 2027-05-12