

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-11-08

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-11-03

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Exit-site, odling – njursjukvård

Revideringar i denna version

Ändring av innehållsansvarig samt arbetsgrupp.

Syfte

Att beskriva när, hur och varför exit-siteodling utförs.

Arbetsbeskrivning

Ordineras vid

Vid misstanke om bakteriell infektion vid exit-site (se styrdokument ”Exit siteinfektion i peritonealdialys (PD) kateter - njursjukvård”).

Material

- Sårödlingsrör (provset med pinne, vit kork).
- Mikrobiologremiss (laboratorieremiss 2, Unilabs).
- Sterila handskar.

Metod

- Aseptiskt handhavande, tvätta huden runt exit-site med NaCl.
- Tag prov från infekterat hudområde med odlingspinnen.
- Tag av korken på odlingsröret och stoppa ner odlingspinnen.
- Ange ordinarie läkares VGR-id på remissen.

Arbetsgrupp

Maria Johansson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Ann Karlsson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Lukas Sjöberg, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Åsa Andersson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-42

Version: 10.0

Giltig från: 2025-11-08

Giltig till: 2027-11-03