

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-12-05

Innehållsansvar: Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

Giltig till: 2026-12-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# Efedrin – spädningsschema

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

## Bakgrund, syfte och mål

Spädningsschema för Efedrinprofylax och -behandling.

## Arbetsbeskrivning

<b>Efedrin</b> (efedrinhydroklorid)	<b>i v injektion</b>
<b>Indikation</b> Blodtrycksfall vid anlagd spinalanestesi med Sufenta och Marcain.	
<b>Komposition</b>	
Injektion Efedrin 50 mg/ml	1 ml
Injektion Natriumklorid 9 mg/ml	10 ml
<b>Beredning</b>	
1. Dra upp 9 ml av injektion NaCl 9 mg/ml. 2. Tillsätt 1 ml injektionsvätska Efedrin 50 mg/ml till en totalvolym på 10 ml. Slutkoncentrationen blir 5 mg/ml.	

**Dosering**

Ges av narkosläkare i itererade små doser om 5–10 mg i v.

**Övervakning**

För utförlig beskrivning se styrdokument Spinalanestesi vid vaginal förlossning.

## Arbetsgrupp

Anne Melbe och Emelie Ottosson.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

**Granskad av:** Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-114

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2024-12-05

**Giltig till:** 2026-12-31