

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-05-29

Innehållsansvar: Susanne Klang, (suskl), Undersköterska

Giltig till: 2026-05-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Förbereda och assistera vid skalpblodprov – förlossningsvård

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Arbetsrutin för att förbereda och assistera vid skalp-pH-mätning.

Arbetsbeskrivning

Tillvägagångssätt

Då läkaren beslutat om pH-mätning – hämta in:

- pH-vagn.
- Optiksladd.
- Laktatmätare.

Duka upp

- Öppna pH-påsen.
- Lägg upp tork nr 14.
- Häll barnolja i skålen.
- Kapillärrör.
- Amnioskop.
- LINA skalpblodprovstagare.

Koppla optiksladd och lampa till ljusaggregat om det behövs. Använd annars den vanliga op-lampan som finns på salen. Rikta den mot amnioskopets öppning. Lägg patienten i sidoläge eller på rygg i benstöd efter läkarens önskemål.

lordningsställande efter pH-prov

- Ta bort och släng knivblad och använd tork.
- Täck över pH-gallret och låt det stå kvar på salen för att användas vid eventuell ny pH-tagning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Susanne Klang, (suskl), Undersköterska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-134

Version: 6.0

Giltig från: 2024-05-29

Giltig till: 2026-05-31