

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-04-10

Innehållsansvar: Annelie Dagobert, (annda107), Sjuksköterska onkologi

Giltig till: 2028-04-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Karboplatin - cytostatikabehandling

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Behandlingsrutin för patienter som får cytostatika med Carboplatin (Paraplatin).

Arbetsbeskrivning

Ges enligt regimbiblioteket på RCC – [Karboplatin](#).

Recidivbehandling

Från och med Carboplatinbehandling nr 5 totalt, ska patienten premedicinera hemma med 32 st tabletter Betapred 0,5 mg på kvällen före behandlingen. 32 st tabletter Betapred 0,5 mg och **Tavegyl 2 mg/ml i v** på morgonen innan behandlingen. Carboplatinbehandlingen ges under 60 minuter. Patienten övervakas under hela infusionen.

Regimskifte vid allergisk reaktion

Vid allergisk reaktion/anafylaktisk chock mot Carboplatin – byte till Cisplatin 50 mg/m² i v och premedicinera med tablett Betapred och **Tavegyl i v** enligt schema för recidivbehandling.

Arbetsgrupp

Annelie Dagobert och Mårten Sjödell.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Annelie Dagobert, (annda107), Sjuksköterska onkologi

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-171

Version: 6.0

Giltig från: 2026-04-10

Giltig till: 2028-04-30