

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Milihate Zekaj, (milze1), Barnmorska

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-31

Klamydia, behandling - gynekologi

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Behandlingsrutin för patient med påvisad klamydiainfektion.

Arbetsbeskrivning

Provtagning

Cervixprov/urinprov/vaginalprov tas vid abortrådgivningsbesök och vid misstänkta infektioner.

Remiss stämplas.

Svar

Hämtas ut från Labsvar i Melior.

Vid påvisad chlamydia lämnas provsvaret till ansvarig smittspårare på gynnottagningen.

Smittspårning

- Kontakt tas med patienten per telefon om möjligt, annars skickas kallelse per brev med tid för smittspårning och behandling. Om patienten har en snar operationstid och inte går att nå per telefon måste man se till att operationspersonalen får vetskap om infektionen så de kan ge behandling peroperativt.
- Vid besöket anmäls patienten via Sminet*, och journalanteckning görs i Melior om att smittspårning påbörjats. Behandlingen är kostnadsfri för patienten och består av:
Alternativ 1: tablett Doxyferm 100 mg, en tablett två gånger dag-

ligen i 7 dagar.

Alternativ 2: vid allergi mot tetracyklin, bör användas sparsamt på grund av stor resistensutveckling – tablett Azitromax 1 000 mg, som engångsdos.

Vid avslutad smittspårning journalförs detta i indexpatientens Melior-journal.

* Dr Bauer skrivs som anmälade läkare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Milihate Zekaj, (milze1), Barnmorska

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-172

Version: 6.0

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-31