

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-05-06

Innehållsansvar: Attila Toth, (attto1), Överläkare

Giltig till: 2026-05-31

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Kateterisering av urinblåsa vid gynekologisk operation - omvårdnad

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Omvårdnadsrutin för patienter som efter gynekologiska operationer har kateter.

Arbetsbeskrivning

KAD öppen ska sättas på

1. Alla laparoskopier/-tomier. Detta för att vi opererar nära blåsan och behöver ha den tömd för siktens skull och att vi inte vet hur länge operationen kommer att pågå.
2. Vaginala hysterektomier.
3. Prolapser.
4. Prolapser med nät.
5. Operativa hysteroskopier med resektoskop.
6. Större vulvoplastiker.

Patienter som ska kissa inför följande operationer

1. Abrasio.
2. VEX/exeres.
3. Bartholincysta.
4. Hysteroskopi – diagnostisk/Thermachoice.
5. LEEP.
6. Mindre vulvoplastik.

Vid Signout som initieras av salspersonal ska läkaren meddela ordination av eventuell KAD. Läkaren skriver ordinationen i Orbit (postop ordinationsrutan).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Attila Toth, (atto1), Överläkare

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-19

Version: 6.0

Giltig från: 2024-05-06

Giltig till: 2026-05-31