

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-05

Giltig till: 2026-12-31

Oxytocin för värkstimulering - spädningsschema

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Spädningsschema för Oxytocinprofylax och -behandling.

Arbetsbeskrivning

Oxytocin	i v infusion
Indikation	
Värksvaghet under utdrivningsskedet.	
Komposition	
Injektion Oxytocin 8,3 µg/ml	1 ml
Infusion Natriumklorid 9 mg/ml	500 ml

Beredning
1. Dra upp 1 ml injektionsvätska Oxytocin 8,3 µg/ml ur en brytampull med bruksfärdig lösning på 1 ml.
2. Tillsätt 1 ml injektionsvätska Oxytocin 8,3 µg/ml till 500 ml NaCl 9 mg/ml.
Dosering Infusionshastighet: Starta infusionen med 20 ml/timme och höj tills effekt uppnås.
Övervakning/observera För utförlig beskrivning se styrdokument Sekundär värksvaghet – behandling av.
Etikett och märkning, hållbarhet och förvaring Förvaras i rumstemperatur. Efter utspädning till infusionsvätska är Oxytocin injektionsvätska hållbar minst 12 timmar vid rumstemperatur.

Arbetsgrupp

Anne Melbe och Emelie Ottosson.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-221

Version: 7.0

Giltig från: 2024-12-05

Giltig till: 2026-12-31