

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-12-19

Innehållsansvar: Maarten Buimer, (maabu1), Överläkare

Giltig till: 2026-12-31

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Preoperativ steriltvätt - gynmottagning

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Förenklade rutiner vid preoperativ steriltvätt av portio.

Bakgrund

Inför olika ingrepp på gynmottagningen, till exempel Pipelle och spiralinsättning, skulle man kunna införa en del förenklade rutiner.

Det infektionsskydd som finns i slidan består av mjölksyrebakterier. Dessa bakterier är vidhäftade vaginalslemhinnan, säkerligen på grund av en aktiv process medierad via IgA-antikroppar. Detta gör att kvinnan redan dagen efter menstruationen är koloniserad med sina gamla lakto-baciller.

Att man inför olika operativa ingrepp försöker ta bort alla dessa bakterier är troligtvis ganska ologiskt, under förutsättning att kvinnan har lakto-baciller. Skulle däremot kvinnan ha en bakteriell vaginos eller annan patologisk flytning, har vaginaltvätten en positiv effekt.

Förenklad rutin till enklare hygienråd

Inför en spiralinsättning respektive vid endometriebiopsi, till exempel Pipelle- eller Endorettprovtagning, används ett icke sterilt, självhållande spekulum. Detta sätts in utan föregående vaginaltvätt. När nu portio är visualiserad torkas portio av med en vaginaltork, eventuellt kan vaginaltorken blötas i lite klorhexidin.

Under ingreppet i övrigt tas inte något spiralset fram och man använder endast rena handskar. Rena klotänger kan användas vid behov.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Maarten Buimer, (maabu1), Överläkare

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-239

Version: 7.0

Giltig från: 2024-12-19

Giltig till: 2026-12-31