

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-02-19

Innehållsansvar: Erika Görander, (erigo5), Medicinsk sekreterar

Giltig till: 2026-02-28

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Preoperativa prover vid poliklinisk gynekologisk operation

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Provtagningsrutin inför olika gynekologiska polikliniska operationer.

Arbetsbeskrivning

Vid följande ingrepp behövs inte blodgruppering eller Hb rutinmässigt

- Abrasio.
- Hysteroskopi, diagnostisk.
- Konisering.
- Marsupialisation.
- PIN.
- Px portio diatermi.
- Spiral in/ut.
- TVT, TOT, MiniArc.

Vid följande ingrepp ska blodgruppering och Hb tas rutinmässigt

- Cervixamputation.
- Laparoskopi, operativ/diagnostisk.
- Prolaps.
- Sterilisering.
- VEX.
- Vulvoplastik.
- Värmedestruktion.

BAS-test behövs inte vid gynekologisk poliklinisk dagkirurgi utom vid medicinsk indikation.

För övrigt gäller anestesis styrdokument [Provtagning – preoperativ](#).

Om blodtransfusion

- Patient som är blodgrupperad: BAS-test 45 minuter.
- Patient som inte är blodgrupperad: akutgruppering + BAS-test 45 minuter.

I båda fallen tar det cirka 60 minuter innan man kan ge transfusion.

Arbetsgrupp

Erika Görander och Karin Ellvig.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Erika Görander, (erigo5), Medicinsk sekreterar

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-240

Version: 7.0

Giltig från: 2024-02-19

Giltig till: 2026-02-28