

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-03-25

Innehållsansvar: Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

Giltig till: 2026-03-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Morfin, spädningsschema – förlossningsvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Spädningsschema för morfinprofylax och –behandling.

Arbetsbeskrivning

Morfin	i v injektion
Indikation	
Svåra smärttillstånd.	
Komposition	
Injektion Morfin 10 mg/ml	1 x 1 ml
Injektion Natriumklorid 9 mg/ml	1 x 10 ml
Beredning	
Injektion	
1. Injektion	
Dra upp 9 ml injektionsvätska NaCl 9 mg/ml.	
2. Tillsätt 1 ml injektionsvätska Morfin 10 mg/ml till en totalvolym på 10 ml.	
Slutkoncentrationen blir 1 mg/ml.	
Dosering	
Ge 2–5 mg i v under 2–5 minuter av ovanstående blandning. Dosen kan upprepas ytterligare en gång efter 10–15 minuter.	

Övervakning/observera

Kvarstanna hos patienten 10 minuter, utvärdera. Kontakta ansvarig narkosläkare om patienten fortfarande är smärtpåverkad.

Etikett och märkning, hållbarhet och förvaring

Hållbarheten efter beredning är 12 timmar i rumstemperatur.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-26

Version: 7.0

Giltig från: 2024-03-25

Giltig till: 2026-03-31