

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2025-06-27

Innehållsansvar: Anna Trollstad, (anntr1), Överläkare

Giltig till: 2027-09-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

STI-prov – kvinnokliniken

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Ett av läkares och barnmorskas uppdrag på kvinnokliniken SkaS är att erbjuda STI-provtagning och arbeta med STI-prevention för patient som söker för misstänkta sådana besvär och önskar provtagning. Patient ska erbjudas provtagning även i samband med besök för andra orsaker om detta anses indicerat.

Arbetsbeskrivning

Vid besök på gynnottagningen på grund av avbrytande av graviditet – se styrdokument [Avbrytande av graviditet – infektionsscreening och behandling vid påvisade genitala infektioner](#).

För vägledning – se [STI-provtagningssmall](#) - Vårdgivarwebben.

Provtagningsanvisningar: [Unilabs \(anvisningar.se\)](#).

Klamydia

[STI-provtagningssmall](#).

Smittskyddet [Klamydia](#).

Nationellt kliniskt kunskapsstöd [Klamydia](#).

Unilabs [Chlamydia trachomatis och neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA](#).

Internetmedicin [Klamydia, genital](#).

SSDV [Genital klamydiainfektion inklusives Lymfogranuloma venereum \(LGV\)](#).

På gynekologimottagningen SkaS, se styrdokumentet [Klamydia, behandling – gynekologi](#).

[Doxyferm](#) 100 mg x 2 i 7 dagar.

Gravida: [Amoxicillin](#) 500 mg x 3 i 7 dagar.

Barnmorska gör smittskyddsanmälan i [SmiNet](#).

Smittspårning görs enligt gällande rutiner, se Vårdgivarwebben [Smittspårning](#) och [STI – sexuellt överförbara infektioner](#).

Kontrollodling är i normalfallet inte nödvändigt och bör endast göras på gravida patienter cirka 4 veckor efter avslutad behandling.

Patientinformation

1177.se [Könssjukdomar – sexuellt överförda infektioner](#).

Smittskyddet [Klamydia](#) (Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad).

GC (gonorrhé)

[STI-provtagningssmall](#).

Internetmedicin [Gonorrhé, genital](#).

Nationellt kliniskt kunskapsstöd [Gonorrhé](#).

Smittskyddet [Gonorrhé](#).

Unilabs [Chlamydia trachomatis och neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA](#).

SSDV [Gonorrhé](#).

Om positiv GC – remiss till Hud-/STI-mottagning SkaS som sedan övertar behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan i [SmiNet](#).

Mykoplasma genitalis

Symtomfria individer provtas *inte* för mykoplasma på grund av ökande antibiotikaresistens.

[STI-provtagningssmall](#).

Unilabs [Mycoplasma genitalium, DNA/RNA](#).

Internetmedicin [Mycoplasma genitalium, infektion](#).

Nationellt kliniskt kunskapsstöd [Mycoplasma genitalium](#).

SSDV [Mycoplasma genitalium](#).

Patientinformation: 1177.se [Könssjukdomar – sexuellt överförda infektioner](#).

Rutin [Mycoplasma genitalium – provtagning och behandling](#).

Vid positiv mykoplasma: tablett [Azithromycin](#) 250 mg, 2 x 1 dag 1 och sedan 1 x 1, i totalt 5 dagar. Se även rutin [Mycoplasma genitalium – provtagning och behandling](#).

Vid makrolidresistens – tablett [Moxifloxacin](#) 400 mg x 1 i 7 dagar. Vid resistens mot azitromycin och moxifloxacin ges tablett [Doxycyklin](#) 100 mg x 2 i 7 dagar, därefter tablett Pristinamycin (licenspreparat) 500 mg, 1 g x 4 i 10 dagar.

Provtagande läkare eller dagbakjour ordinerar behandling efter provsvar. Observera att resistensbestämning eventuellt görs av laboratoriet och detta anges i så fall på provsvaret.

Vid graviditet: samma behandling enligt ovan efter graviditetsvecka 12+0 (Pristinamycin bör inte ges).

Mykoplasma är inte anmälningspliktigt, men patientens partner(-s) rekommenderas att själv kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Syfilis

Se SkaS styrdokument [Infektionsscreening under graviditet – handläggning](#).

Smittskyddet [Syfilis](#).

SSDV [Syfilis](#).

Syfilis är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige – erbjuds inom MHV endast som screeningprov under graviditet.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd [Syfilis](#).

Eventuellt positiv syfilis – remiss till Hud-/[STI-mottagning](#) SkaS.

Referenser

Smittskyddet VGR [STI – sexuellt överförbara infektioner](#).

[Unilabs \(anvisningar.se\)](#).

Folkhälsomyndigheten [Sjukdomsinformation om sexuellt överförda infektioner \(STI\)](#).

[Internetmedicin.se](#).

1177.se [Könssjukdomar – sexuellt överförda infektioner](#).

[Kontaktblödningar hos kvinnor under 25 år i samband med preventivmedelsrådgivning](#) (MHV).

Vårdgivarguiden [Smittskyddsblad](#) (olika språk).

Smittskyddsläkarföreningen [Smittskyddsblad](#).

Läkemedelsverket [Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation](#).

Läkemedelsboken kapitel [Sexuellt överförbara sjukdomar](#).

Vårdgivarwebben [Lagar och förordningar](#).

[Rekommendationer från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi](#).

[REK-listan](#).

Styrdokument Regionhälsan [Klamydia, gonorré, mycoplasma](#).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Anna Trollstad, (anntr1), Överläkare

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-265

Version: 11.0

Giltig från: 2025-06-27

Giltig till: 2027-09-30