

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-04-10

Innehållsansvar: Tina Thorsell, (tinth), Barnmorska

Giltig till: 2028-04-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# Provtagning och ID-märkning av nyfödda barn

## Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

## Bakgrund, syfte och mål

Arbetsrutin för provtagning och ID-märkning av nyfödda barn.

## Arbetsbeskrivning

### pH-provtagning efter barnets födelse

Inför förlossning märks pH-sprutorna med barnnummer som skrivs på en etikett. Syftet är att öka säkerheten. Provet analyseras på förlossningsavdelningen.

### Blodgruppering och ID-märkning av barn på förlossningen

1. Innan prov från navelsträngen tas, märks röret och remissen med en etikett där barnnumret är angivet.
2. Provet tas ur navelsträngen och får ligga kvar på förlossningssalen tills det är märkt med fullständigt reservnummer/personnummer och efternamn. Unilabs önskar att det barnnummer som vi märkt prov och remiss med är synligt. Det finns då en spårbarhet om det senare skulle uppstå någon tveksamhet.
3. Barnets födelse registreras elektroniskt på förlossningssalen till skatteverket, se Fokus - [Elektronisk födelseanmälan](#). När detta är gjort måste barnmorskan avvakta en stund innan informationen gått över till befolkningsregistret (befreg).

***Angående barn som inte får personnummer***

***Angående barn som får personnummer men där personnumret inte överförs till ELVIS innan prov lämnas för analys eller då barnet flyttas från förlossningen***

Barnmorskan skapar reservnummer i ELVIS, se rutin

[Befolkningsregistertjänsten \(Befreg\)](#).

Om ett reservnummer är skapat ska detta användas under hela vårdtillfället. Gäller även på PKU-remiss. Reservnumret ska dokumenteras på FV2 under Person/Reservnummer.

4. Skriv ut ID-band från ELVIS på förlossningen. Alla nyfödda barn ska vara märkta med barnnummer, ID-band med reservnummer/personnummer från ELVIS innan förflyttning från förlossningen sker (sätts på fotlederna). Vid ID-märkning kontrollera gentemot FV2 och om efternamnet på barnet inte stämmer, observera att barnet kan ha barnafaderns efternamn, kontrollera då med föräldrarna. ID-band signeras och dateras enligt Vårdhandboken.
5. Om endast blodgruppering tas (inte annan blodprovstagning) skrivs lab-etiketter ut via ELVIS. Vid ytterligare blodprovstagning skapas vårdkontakt i Melior enligt nedan.

## Blodgruppering samt provtagning på barn på förlossningen och BB

**Vid blodgruppering samt provtagning (blodprov, odling) på barn används vårdkontakt BARÖV**

### Vid blodprovstagning

Beställning görs i Melior (som på vuxen patient). Viktigt att ta reda på ordinerande barnläkares namn. Telefonkontakt bör tas med barnläkare för att stämma av provsvar.

### Vid blodgruppering

1. Två stycken extra etiketter skrivs ut via Melior eller ELVIS. Dessa sätts på rör och remiss.
2. På etiketten finns personnummer och efternamn, kön behöver inte uppges. På etiketten finns plats för datum och analys.
3. ***Remissen kompletteras med mammas personnummer och namn.***

### Vid odlingar till mikrobiologen

1. Skriv ut extra etikett via Melior för märkning av pappersremissen. Avsändarkod 0157.

2. Använd den förtryckta etiketten längst ned på remissen för märkning av rör.

## PKU-provtagning

Moderns namn samt telefonnummer ska handskrivas med blått bläck.

Förtryckta etiketter ska inte användas på grund av att de inte är värmebeständiga.

Om barnet har fått ett reservnummer under vårdtiden ska detta anges på PKU-remissen. Detta enligt rekommendation från PKU-lab samt Vårdhandboken.

Tas på alla barn, tidigast vid 48 timmars ålder och senast inom fem dygn.

Remiss                      Specialremiss från PKU-lab.

Alla fyra markerade ringar på remissen ska fyllas fullständigt enligt anvisning.

Övrigt                      Remissen torkas plant i minst tre timmar och läggs provtagningsdagen i svarskuvert. Lägg i brev korg för utgående post.

## Observera

Vid all provtagning på nyfödda barn - var alltid observant på barnets identitet. Viktigt att nummerband och ID-band sätts på så att de inte kan åka av samt att texten är väl synlig. För ökad säkerhet används utskrivna ID-etiketter från Melior/ELVIS för märkning av remisser och provrör.

Samordna provtagningarna om möjligt om fler prover ska tas.

## Smärtlindring

- Omvårdnadsstudier har visat att oralt tillförd sockerlösning (glukos 30 %) *omedelbart* före blodprovstagning och hud mot hud-kontakt ger en viss smärtlindring. Kombinationen av dessa är mer effektiv än var för sig.
- Provtagning bör ske inom två minuter efter tillförd glukos, gäller speciellt vid kontroll av B-glukos. Vid behov kan doseringen upprepas efter fem minuter.
- Drag upp 1-2 ml 30 %-ig glukos i en spruta och låt barnet suga på sprutspetsen samtidigt som du låter glukoslösningen droppa in i barnets mun.
- Amning i samband med provtagning är lika effektivt!
- Vid P-glukos överväg venös provtagning i stället för kapillär, "squeezing hurts more than lancing".

## Arbetsgrupp

Tina Thorsell och **Erika Bernvik**.

## Referenser

Styrdokument [Identifiering och ID-märkning av vårdtagare vid Skaraborgs Sjukhus.](#)  
[Vårdhandboken.](#)

Chermont, Falcao, Silva, Balda, Guinsburg. [Skin-to-skin contact and/or oral 25 % dextrose for procedural pain relief for term newborn infants.](#)  
*Pediatrics*. Vol 124. No 6. December 1, 2009.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Tina Thorsell, (tinth), Barnmorska

**Granskad av:** Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-34

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-04-10

**Giltig till:** 2028-04-30