

Paracervikalblockad (PCB) som smärtlindring vid gynnottagning eller gynavdelning

Förändringar sedan föregående version
Nytt styrdokument.

Bakgrund och syfte

Att beskriva förslag till tillvägagångssätt för anläggning av PCB för att kunna erbjuda multimodal smärtlindring vid exempelvis spiralinsättning, abort eller hysteroskopi.

Utförande

- Dokumentera VAS före och efter blockaden.
- Förbered två sprutor med 10 ml Marcain (Bupivacaine) 2,5 mg/ml alternativt Carbocain (Mepivacaine) 10 mg/ml i vardera. Vid önskemål om längre duration kan annat lokalbedövningsmedel övervägas.
- Använd kanyl med sprutförlängare alternativt kobaknål.
- Aspirera före injektion för att undvika intravasal administration.
- Administrera totalt 20 ml Marcain (Bupivacaine) alternativt Carbocain (Mepivacaine) i övergång mellan cervix och fornix. I första hand genom 10 ml på två punkter (kl 2 och 10). I andra hand 5 ml på fyra punkter (kl 2, 4, 8 och 10).
- Vid behov kan blockaden upprepas upp till två gånger ytterligare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Malin Pasanen, (malpa12), Underläkare, ST

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-372

Version: 1.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-30