

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-04-12

Innehållsansvar: Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

Giltig till: 2026-04-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Terbutalin (Bricanyl) vid prematurt värkarbete - spädningsschema

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Spädningsschema för Bricanylprofylax och -behandling.

Arbetsbeskrivning

Bricanyl (terbutalin)	i v infusion
Indikation Prematura sammandragningar. Andrahandspreparat. Tractocile ska användas i första hand.	
Komposition Injektion Bricanyl 0,5 mg/ml Infusion Natriumklorid 9 mg/ml	10 x 1 ml 1 000 ml
Beredning 1. Dra upp 10 ml injektionsvätska Bricanyl 0,5 mg/ml ur 10 brytampuller bruksfärdig lösning på 1 ml. 2. Tillsätt 10 ml injektionsvätska Bricanyl 0,5 mg/ml till 1 000 ml infusion NaCl 9 mg/ml.	

Dosering

Starta infusionen med 120 ml/timme. Vid fortsatta sammandragningar kan efter 30 minuter, på ordination av läkare, höjning till 180 ml/timme ske. Maximal dropptakt 300 ml/tim.

Den lägsta dos som behövs för att slå ut värkarna bibehålls under två timmar, därefter sänks dropptakten med 30 ml/timme till lägsta effektiva underhållsdos, vanligtvis 30 ml/timme, som får fortgå under cirka fyra timmar, alternativt under natten. En timme innan droppet utsätts ges tablett Bricanyl depot 7,5 mg.

Övervakning

För utförlig beskrivning se styrdokument Prematura sammandragningar.

Etikett och märkning, hållbarhet och förvaring

Förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänslig. Färdigberedd lösning bör användas inom 12 timmar.

Arbetsgrupp

Anne Melbe och Emelie Ottosson.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Anne Melbe, (annme7), Barnmorska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-39

Version: 10.0

Giltig från: 2024-04-12

Giltig till: 2026-04-30