

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-03-17

Innehållsansvar: Malin Pasanen, (malpa12), Underläkare, ST

Giltig till: 2028-03-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Avbrytande av graviditet – infektions- screening och behandling vid påvisade genitala infektioner

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Screening och behandling vid påvisade genitala infektioner hos patient som ska genomgå avbrytande av graviditet.

Infektion - screening

Utförs på gymmottagningen vid abortbesök:

- C trachomatis och N gonorrhoeae från vaginalprov. Bakteriell vaginosis – wet smear, pH, snifftest.

Behandling

- **Chlamydia**
Doxyferm 100 mg x 2 i 7 dagar.
Barnmorska på gymmottagningen har en stående ordination. Kostnadsfritt.
- **Bakteriell vaginosis – BV (olika behandlingsalternativ)**
Se styrdokument [Bakteriell vaginosis – behandling och patientinformation](#), rubrik Behandling inför abort.
- **Gonorré**
Handläggs i samråd med STI-mottagning. Odling bör tas innan anti-

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

biotikabehandling startas. Se smittskyddsblad [Gonorré](#) alternativt
SSDVs rekommendationer [Gonorré](#).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Malin Pasanen, (malpa12), Underläkare, ST

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-5

Version: 12.0

Giltig från: 2026-03-17

Giltig till: 2028-03-31