

Gäller för: VE Ortopedi

Innehållsansvar: Paula Berg, (paube), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-11

Giltig till: 2026-12-06

Lokalbedövning vid kortvarig handoperation

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet

Bakgrund, syfte och mål

Skapa rutin för lokalbedövning av patienter som genomgår kortvariga handoperationer i Lidköping.

Arbetsbeskrivning

Ta 1 % Mepivacain/Carbocain (10 mg/ml) utan adrenalin. Blanda 9 ml av denna Mepivacainlösning med 1 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml (600 mmol/1000).

Hållbarhet: 12 timmar efter blandning

Natriumbikarbonat: Öppnad flaska hållbarhet 12 timmar i kyl

Observera att man inte kan buffra Marcain (=bupivakain) på detta sätt på grund av att det blir en fällning!

Den högsta rekommenderade dosen vid ett och samma tillfälle beräknas efter 5 mg/kg kroppsvikt. Totaldosen måste korrigeras med hänsyn till patientens ålder, konstitution och övriga relevanta omständigheter.

Kontraindikationer

Överkänslighet för lokalanestetika av amidtyp eller övriga ingående ämnen, det vill säga överkänslighet för ”tandläkarbedövning”.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ortopedi

Innehållsansvar: Paula Berg, (paube), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9720-1295490241-23

Version: 5.0

Giltig från: 2024-12-11

Giltig till: 2026-12-06