

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Marcelo Ayala, (maray1), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-03

Dakryocystit

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Rutin vid infektiös samt kronisk dakryocystit.

Utförande

Rodnad, svullnad över tår säcken. Eventuellt feber. Försök **ej** sondera vid akut infektion.

Behandling: Heracillin 1 g x 3 i 10 dagar.

Överväg incision och dränage om “pointed abscess”.

Ta gärna konjunktivalodling eller odling då man dränerar.

Återbesök: ~ 5-7 dagar i normalfall.

Kronisk dakryocystit

Överväg slangnedläggning, dacryocystorhinostomi eller dacryocystectomy. Dacryocystectomy hos äldre patienter (>90 år).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Marcelo Ayala, (maray1), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-13

Version: 7.0

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-03