

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Ágnes Butsy, (gnebu1), Underläkare, ST

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-07-18

Giltig till: 2026-07-18

Episklerit - behandling

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid, ändrat innehållsansvarig.

Bakgrund, syfte och mål

Behandling av episklerit.

Arbetsbeskrivning

Akut rodnad, oftast sektoriell, ibland diffust i ett eller båda ögon. Ömhet.

Mild eller måttlig värk. Episkleriter brukar blekna med Phenylephrine vilket kan hjälpa med diagnosticeringen, men också maskera rodnaden vid undersökningstillfället.

Behandling: Isopto-Maxidex x 3 i 2-3 veckor alternativt NSAID p.o, t ex Ipren 200-400 mg x 4.

Återbesök: Oftast behövs inget återbesök då patienten ka höra av sig vid försämring eller fortsatta besvär. Vid mycket kraftiga episkleriter, speciellt om man även funderar på sklerit, kan man ta återbesök inom 1-7 dagar beroende på utseende och besvär.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Ágnes Butsy, (gnebu1), Underläkare, ST

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-22

Version: 7.0

Giltig från: 2024-07-18

Giltig till: 2026-07-18