

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Giltig från: 2025-06-26

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Giltig till: 2027-06-26

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Herpes zoster oftalmicus - handläggning

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Underlätta handläggning av herpes zoster oftalmicus.

Utförande

Ofta typiska blåsor, känselstörning och värk. Konjunktivit, keratit (epitelial eller stromal), uveit, förhöjt IOP, sklerit, optikusneurit med mera kan finnas.

Behandling:

Tablett Valtrex 1 g x 3 i 7 dagar, helst inom 72 timmar från blåsornas uppträdande.

Om ögonengagemang:

- Lokala antibiotikadroppar om sekundär infektion eller epiteldefekter.
- Steroider lokalt om uveit.
- IOP-behandling.
- Eventuellt cykloplegi.

Återbesök:

~ 1 vecka-10 dagar om ögonengagemang(eventuell uveit och tryckstegring kommer ofta efter en vecka).

Tänk på remiss till smärtmottagningen för eventuellt ganglion stellatum-blockad tidigt (helst inom 4 veckor) om rejäl smärta. Mer frikostig med remiss för patienter >60 år. Dessa har större risk för postherpatisk neuralgi.

Även Gabapentin har effekt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-32

Version: 9.0

Giltig från: 2025-06-26

Giltig till: 2027-06-26