

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-01

Giltig till: 2027-07-01

# Kontaktallergi utlöst av ögondroppar - handläggning

## Förändringar sedan föregående version

Mindre revidering.

## Bakgrund och syfte

Handläggning av kontaktallergi utlöst av ögondroppar.

## Förutsättningar

### Ansvar

Riktlinjer för samtliga användare i verksamheten.

## Utförande

### Arbetsbeskrivning

- Sätt ut misstänkta droppar.
- Ge Ficortril ögonsalva 0,5 % x 3 (smörjs på huden + ev. i ögat) tills besvärsfrihet. Därefter successiv nedtrappning parallellt med mjukgörande (det tar 2–3 veckor för huden att läka).

Ev. utredning samtidigt med behandlingen ovan.

- Droppa med det misstänkta preparatet i armvecket x 2 i 4 dagar.  
Om reaktion – Kontaktallergi.  
Om ingen reaktion – Kontaktteksem.

Det vanligaste är kontaktteksem, d.v.s. ett eksem orsakat av irriterande droppar i kombination med mekanisk retning av predisponerad hud. Samma droppe kan här fungera bra vid ett senare tillfälle.

Om stora besvär och/eller många frågetecken – remiss till hudkliniken för testning.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Ögon ÖNH Käk Log

**Innehållsansvar:** Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

**Granskad av:** Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9725-959466179-41

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-07-01

**Giltig till:** 2027-07-01