

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-01

Giltig till: 2027-07-01

Marginalkeratit - handläggning

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Underlätta handläggning av marginalkeratit.

Utförande

Immunologisk reaktion mot stafylokocker, patienten har ofta stafylokockblefarit.

Fynd:

Ofta flera ibland bilaterala perifera korneala stromala infiltrat med klar kornea mellan infiltrat och limbus. Litet eller inget färgupptag. Recidiv vanligt.

Behandling:

1. Lokal antibiotika + lokal steroid (t.ex. Terracortril med Polymyxin B, salva eller droppar x 3).
 - Eventuellt återbesök 7–10 dagar.
 - Eventuellt inget återbesök om tidigare haft samma åkomma och brukar läka.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-48

Version: 8.0

Giltig från: 2025-07-01

Giltig till: 2027-07-01