

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Marcelo Ayala, (maray1), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-03

Provexcision med lymfommisstanke - ögonsjukvård

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Ge underlag för korrekt provtagningsrutin för patientgruppen.

Utförande

Då provexcision görs på misstanke om lymfom ska patologerna få preparatet helt ofixerat och färskt. Man har då möjlighet att göra flödescytometri för att lättare differentiera mellan inflammatorisk sjukdom och lymfom. Ingreppet ska helst göras måndag-torsdag förmiddag. Meddela patologen att prov kommer, detta kan eventuellt undersköterska göra preoperativt telefonledes. När provet lämnas ska man säga till att det är ofixerat så att det inte blir stående.

- Gör först en anmälan i Orbit. Skriv att det rör sig om lymfom. Planera en dag som pterygium, det vill säga att man har lim.
- Ring till patologen några dagar innan och fråga hur provet ska skickas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Marcelo Ayala, (maray1), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-55

Version: 7.0

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-03