

Akut trångvinkelglaukom - handläggning

Förändringar sedan föregående version

Revidering under rubriken Behandling.

Bakgrund, syfte och mål

Underlätta handläggningen i den kliniska vardagen.

Arbetsbeskrivning

Symtom

- Värk
- Dimsyn
- Ev. Allmänpåverkan

Fynd

- Kraftigt förhöjt intraokulärt tryck
- Injicerat öga
- Kornealödem
- Medelvid ljusstel pupill
- Grund kammare

Behandling

- **Minska kammarvattenproduktion:**
 - Tablett Diamox 500 mg eller 10 mg/kg (om ej kontraindikation).
 - 1 droppe Timolol (sätt in Timolol x 2).
 - 1 droppe Brimonidin (sätt in Brimonidin x 2)
- **Minska inflammation:**
 - Dexametason ögondroppar (t.ex. Dexafree eller Isopto-Maxidex). Sätt in dexametason x 4–6.
 - Vila 1–2 timmar i ryggläge i ljust rum.

- När IOP <50 mmHg ge Pilocarpin (2 % eller 4 %) en gång var 15:e minut i 1 timme.
- Om ej effekt av ovanstående inom 1–1,5 timme, ge Glycerol 1 ml/kg peroralt. Om ej effekt av Glycerol inom 1–1,5 timme, ge Mannitol, se separat styrdokument: [Mannitolbehandling - ögonsjukvård](#).
Låt patienten ligga i ryggläge i väntan på behandlingseffekt.
- YAG-iridotomi så fort kornea klarnat.

Glöm inte andra ögat - profylaktisk behandling?

Ofta är TVG kombinerat med öppenvinkelglaukom - fortsatt uppföljning indicerad.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-6

Version: 13.0

Giltig från: 2026-04-22

Giltig till: 2028-04-22