

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-25

Giltig till: 2027-06-25

Retrobulbär alkoholblockad

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Handläggning av absolut glaukom, då patienten har svår värk på grund av högt tryck. Ögat är blint eller mycket svårt synskadat.

Utförande

Indikation

Absolut glaukom, då patienten har svår värk på grund av högt tryck. Ögat är blint eller mycket svårt synskadat.

För injektionen av utspädd sprit

1 flaska 5 ml utspädd sprit 70 %

1 spruta 5 ml

1 uppdragningskanyl (rosa)

1 kanyl för injektion, storlek och 0,4 x 40 mm

Handskar

Kompress eller bomullstuss

Teknik

Patienten ligger ned i säng på behandlingsrum.

Tvätt med spritsudd under ögat.

Retrobulbäranestesi med Carbocain 2 %.

Nålen (0,4 x 40 mm) från retrobulbäranestesin kan ligga kvar till alkoholinjektionen.

Retrobulbärt läggs cirka 2–3 ml utspädd sprit 70 %. Variera nålens läge.

Efter injektionen får patienten ligga någon timme med förband på ögat.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-62

Version: 6.0

Giltig från: 2025-06-25

Giltig till: 2027-06-25