

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals
Innehållsansvar: Sofia Bjaaland, (sofbj2), Specialistläkare
Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Enhetschef
Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-22

Rutin för administrering av Octosim Injektionsvätska på ÖNH-mottagningen, SkaS

Förändringar sedan föregående version

Nytt giltighetsdatum

Bakgrund och syfte

Rutin för administrering av läkemedlet Octostim till patienter på ÖNH-mottagningen. Ges efter läkarordination till patienter med pågående blödningen eller i vissa fall som blödningsprofylax inför mindre kirurgiska ingrepp.

Läkemedelsbeskrivning

Faktor VIII-frisättare, Desmopressin.

Octostim intravenöst leder till att halten av faktor-VIII koagulationsaktivitet i plasma ökar. Även halten av von Willebrand faktor-antigen ökar. Är analogt med ADH, antidiuretiskt hormon. Kan därför ge minskade diuresmängder.

OBS Övergående blodtryckssänkning med takykardi och ansiktsrodnad vid administreringstillfället kan ses som biverkan.

Andra vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, magknip, illamående och trötthet.

Indikationer

Blödningsprofylax i samband med kirurgi alt. vid postoperativ blödning eller svårkontrollerad näsblödning hos patienter med:

- mild hemofili A

- mild von Willebrands sjukdom (ej typ 2B)
- förlängd blödningstid
- terapeutiskt vid blödning

Kontraindikationer

- instabil angina pectoris
- inkompenserad hjärtsvikt
- von Willebrands sjukdom typ 2B
- polydipsi (syndrom med överdriven törst)

Försiktighet vid användning till små barn och äldre. Risk för vätskeretention och rubbad elektrolytbalans.

Utförande

Beredning/Dosering av Octostim Injektionsvätska 15 µg/ml

- 0,3 µg/kg kroppsvikt (läkare beräknar och ordinerar, finns tabell i FASS)
Maxdos 30 µg
- Ges som intravenös infusion under 15 - 30 minuter och uträknad dos späds då med 100 ml NaCl 9 mg/ml.

Kan eventuellt upprepas 1–2 ggr med 6–12 timmars mellanrum, med observans på diures.

Källor

[Octosim - FASS Vårdpersonal](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals

Innehållsansvar: Sofia Bjaaland, (sofbj2), Specialistläkare

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Enhetschef

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9726-2054514065-32

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-22