

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals

Giltig från: 2025-06-11

Innehållsansvar: Hanna Ros, (hanny3), Överläkare

Giltig till: 2027-06-11

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Enhetschef

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Bedövning av trumhinna med EMLA kräm eller Xylocainspray - ÖNH

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetsdatum

Bakgrund, syfte och mål

Bedövning trumhinna innan hål görs på trumhinnan.

Arbetsbeskrivning

1. MIUS
2. Lägg på rikligt med EMLA kräm på trumhinnan med en liten ståltops. Smörj även lite i hörselgången. Alternativt sug upp ca 1-1,5 ml EMLA kräm i en spruta. Applicera en grön sug på sprutan och spruta in på trumhinnan och fyll upp inre hörselgången. Bara du ser vad du gör och att krämen kommer på rätt plats. Vänta 30 minuter. Alternativt spraya med Xylocain, 10 mg/ml, vänta 5 minuter.
3. Sug upp all EMLA kräm/Xylocainspray.
4. Paracentes.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals

Innehållsansvar: Hanna Ros, (hanny3), Överläkare

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Enhetschef

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9726-2054514065-6

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11