OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log
Innehållsansvar: Maria Olsson, (marol54), Överläkare
Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Enhetschef
Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-20
Giltig till: 2028-08-20

FESS-kirurgi

Revideringar i denna version

Förlängning giltighetsdatum.

Syfte

Hemostas/Avsvällning

Förutsättningar

Avgränsningar

Operationssköterska

Postoperativ sköterska

Operatör

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Arbetsbeskrivning

På postoperativa avdelningen ges Nezeril 0,5 mg/ml 2 pipetter i var näsborre.

På operation preoperativt lägger operationssköterskan in gasvävstamponad indränkt i Nafazolin (0,17 mg/ml) – Lidokain (34 mg/ml) i båda näskaviteterna.

Operatör lägger ytterligare Nafazolin-Lidokain i mellersta näsgången med hjälp av hjärntork indränkt med lösningen samt lägger infiltration med Marcain-adrenalin 2,5 mg/ml.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Maria Olsson, (marol54), Överläkare

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Enhetschef

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9726-2054514065-9

Version: 8.0

Giltig från: 2026-08-20

Giltig till: 2028-08-20