

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Maria Olsson, (marol54), Överläkare

Granskad av: Martin Oscarsson, (maros21), Processchef

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-12

Giltig till: 2026-11-07

# FESS-kirurgi

## Revideringar i denna version

Ändring av giltighetsdatum.

## Syfte

Hemostas/Avsvällning

## Förutsättningar

Avgränsningar

Operationssköterska

Postoperativ sköterska

Operatör

## Arbetsbeskrivning

På postoperativa avdelningen ges Nezeril 0,5 mg/ml 2 pipetter i var näsborre.

På operation preoperativt lägger operationssköterskan in gasvävstamponad indränkt i Nafazolin (0,17 mg/ml) – Lidokain (34 mg/ml) i båda näskaviteterna.

Operatör lägger ytterligare Nafazolin-Lidokain i mellersta näsgången med hjälp av hjärntork indränkt med lösningen samt lägger infiltration med Marcain-adrenalin 2,5 mg/ml.

## Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Ögon ÖNH Käk Log

**Innehållsansvar:** Maria Olsson, (marol54), Överläkare

**Granskad av:** Martin Oscarsson, (maros21), Processchef

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9726-2054514065-9

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2024-11-12

**Giltig till:** 2026-11-07