

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Giltig från: 2025-06-10

Innehållsansvar: Helén Blom, (helan10), Systemförvaltare

Giltig till: 2027-06-10

Granskad av: Annette Trengé Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

# Läkemedelsöverkänslighet – dokumentation i Melior

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

## Bakgrund, syfte och mål

All dokumentation av läkemedelsöverkänslighet skall dokumenteras i Melior för att säkra patientens vård och behandling.

## Förutsättningar

### Ansvar

- Läkaren är ytterst ansvarig för den medicinska bedömningen av händelsen och dokumentation i Melior.
- Läkaren är ansvarig för att ompröva befintlig information om överkänslighetsreaktion.
- Sjuksköterska kan dokumentera läkemedelsöverkänslighet, men alltid med läkare som ansvarig.
- Sekreterare kan dokumentera på uppdrag av läkare.

## Arbetsbeskrivning

### När ska dokumentationen ske i relation till vårdprocessen?

- Dokumentation av läkemedelsöverkänslighet ska ske så snart möjligt efter det att informationen kommer till en hälso- och sjukvårdspersonals kännedom. Detta innebär att dokumentationen, för att minimera onödig ledtid, om möjligt ska skrivas in direkt i journal och inte dikteras. Läkaren ska snarast signera anteckningen.

- Endast en registrering ska göras för varje unikt preparat.

### Vad ska dokumenteras?

Läkemedelsöverkänslighet som vid förnyad exponering bedöms kunna ge livshotande reaktion eller bestående skada hos patienten.

Det är viktigt att dokumentera:

- Symtombild
- Allvarlighetsgrad, som anges i tre nivåer: Livshotande, skadlig eller besvärande
- Säkerhetsgrad: Konstaterad, trolig eller misstänkt

### Observera att varningarna inte är heltäckande!

Läkemedel som innehåller samma verksamma substans kan ha helt skilda ATC-koder. Koderna bygger på olika läkemedelsgrupper. Systemet varnar för de läkemedel som har samma ATC-kod. Detta kan innebära att flera registreringar måste göras och då på substansnivå. Däremot ska överkänslighet mot visst preparat inte upprepas (t.ex. när överkänsligheten meddelas anamnestiskt) Se [Meliorhandbok](#).

### Var dokumenterar man?

I Melior:



- Registreringen skapar textlänk i Melior samt denna symbol på samtliga delar av patientens Meliorjournal.

### Hur dokumenterar man?

Dokumentationen sker via ”Menyraden – läkemedelsöverkänslighet (ATC-kod)”, alternativt via läkemedelsmodulen om ett läkemedel sätts ut på grund av läkemedelsöverkänslighet.

#### Instruktion via Menyraden:

1. Välj patient.
2. Gå via menyraden- Läkemedel- Läkemedelsöverkänslighet. Alternativt via varningstriangeln om den redan är tänd.
3. Välj Lägg till.
4. Välj knappen? och välj aktuell ATC-kod.
5. Sökning kan göras via trädsökning eller Namnsökning. Ändra eventuellt till Läkemedelsnamn.
6. Dokumentera kommentar i textruta.

7. Välj ansvarig (gäller sjuksköterska, undersköterska och sekreterare).

## Käll- och litteraturförteckning

Vårdhandboken

Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Skaraborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Helén Blom, (helan10), Systemförvaltare

**Granskad av:** Annette Trengé Jarlshammar, (antr2),  
Utvecklingschef

**Godkänd av:** Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

**Dokument-ID:** SKAS9730-1455443510-82

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2025-06-10

**Giltig till:** 2027-06-10