

Etikett för hållbarhet

Ange datum för det läkemedel som har sämst hållbarhet

Akutask SkaS -2026/2027

Psykiatriska mottagningar

Falköping / Lidköping / Mariestad / Skövde

Hjärnstimulering/ LARO /Rehabilitering

Rättspsykiatriavdelning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tidskritiska läkemedel behöver förvaras på egen vårdenhet (ges inom 4 minuter, innan hjärtspark alternativt ambulans kommer).

Kriterier för urval av läkemedel:

- Det ska vara lätt att göra rätt även för den som är ovan (både ordination och administrering), svårt att göra fel (orsaka vårdskada)
- Läkemedel som behövs omgående i akut fas för anafylaxi, hypoglykemi, kramper, angina pectoris
- Innehållet passar för patienter som kräver vuxen-doser

Nedanstående anvisningar är **Generella direktiv om läkemedelsbehandling** (go) på de enheter där medicinskt ansvarig läkare har godkänt användningen.

Indikation	Preparat	Mängd	Ordination / kontraindikation	Utgångsdatum
Akutbehandling av svåra allergiska reaktioner (anafylaxi)	Epipen inj penna 300 mikrogram <i>Alternativt:</i> Jext/Anapen/Emerate	2 st	Vuxna: Ge 1 autoinjektor 300 mikrogram Ge ytterligare en autoinjektor 300 mikrogram vid avsaknad av klinisk förbättring eller om försämring inträffar, 5–15 minuter efter den första injektionen. Emerade ska ges intramuskulärt på lårets utsida. Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen. Injektionen kan ges genom kläder.	
Kupering av angina pectorisattack. Initial, symtomlindrande behandling vid misstanke på akut coronart syndrom respektive vid akut vänsterkammarsvikt	Glytrin Sublingualspray 0,4 mg/dos <i>Unimedica Pharma</i> <i>Alternativt:</i> Nitrolingual Sublingualspray 0,4 mg/dos, <i>Navamedic</i>	1 st (200 doser)	Vuxna: <i>Angina pectoris:</i> Doseringen är individuell och ska styras av det kliniska svaret. Spraya 1-2 doser (0,4-0,8 mg) på munslemhinnan under tungan medan patienten håller andan. Maximalt tre doser åt gången. Stäng munnen efter varje sprayning. <i>Akut hjärtinfarkt eller akut vänsterkammarsvikt:</i> 1-2 doser (0,4-0,8 mg) sprayas under kontinuerlig kontroll av det systoliska blodtrycket, som bör vara över 100 mm Hg. Uppnås ingen klinisk effekt kan samma dos ges efter 10 minuter.	
Astma, bronkkonstriktion	Airomir (Autohaler) suspension 0,1 mg/dos, inhalationsspray, <i>Teva</i>	1 st (200 doser)	1-2 doser för anfallskupering, max 16 inhalationer/dag (vuxna)	

Indikation	Preparat	Mängd	Ordination/Kontraindikation	Utgångsdatum
Hypoglykemi (insulinkoma)	Glukos Fresenius Kabi inj 300 mg/ml <i>Alternativt</i> Glucagon Novo Nordisk 1 mg förfylld spruta för im användning	10x10 ml 1st (1mg)	Vuxna: ca 1–1,5 ml injektionsvätska/kg kroppsvikt ges som intravenös injektion. Vid kortvarig akutillförsel kan lösningen ges i perifer ven. Extravasal injektion kan orsaka vävnadsskador. Om ingen effekt visas efter 5 min, skall ytterligare orsak till medvetslöshet misstänkas vävnadsskador. Om ingen effekt visas efter 5 min, skall ytterligare orsak till medvetslöshet misstänkas Glucagon Novo Nordisk 1 mg: Vuxna: Dos: 1 mg injiceras intramuskulärt. Hållbarhet vid förvaring i rumstemperatur (25°C): upp till 18 månader. LJUSKÄNSLIG. Förvaras i originalförpackningen	
Epileptiska kramper	Diazepam Destin rektallösning, 10mg <i>Alternativt:</i> Stesolid® rektallösning, 10mg, TEVA	2st á 2,5ml endåsb ehållare	Vuxna: 2st 10mg tuber ges rektalt. Om ingen effekt ses efter 10 minuter kan ytterligare en 10mg tub ges	
Epileptiska kramper	Buccolam 10mg munhålelösning	2st x 1 dos(er)	Vuxna: BUCCOLAM är avsett för användning i munhålan. Hela mängden lösning sprutas in långsamt i mellanrummet mellan tandköttet och kindens insida. Laryngo-trakeal insprutning ska undvikas för att förhindra oavsiktlig aspiration av lösningen. Om det behövs (för större volymer och/eller yngre patienter) ska cirka hälften av dosen först ges långsamt i ena sidan av munhålan och sedan resterande dos i andra sidan. BUCCOLAM är kontraindicerat för patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Förvara sprutan för oral användning i det skyddande plastfodralet. Hållbarhet: 2år. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.	
Upphävande av CNSdepressioner; framför allt andningsdepressioner, orsakad av opioider och partiella opioidagonister/antagonister	Nyxoid Näspray, lösning 1,8 mg	2st x 1 dos(er) spraybe hållare	Vuxna och äldre: 1,8 mg administrerat i en näsborre (en nässpray). I vissa fall kan ytterligare doser behövas. Lämplig maximal dos Nyxoid beror på situationen. Om patienten inte svarar ska den andra dosen administreras efter 2-3 minuter i den andra näsborren. Om patienten svarar på den första administreringen, men sedan får återfall av andningsdepression ska den andra dosen administreras omedelbart. Ytterligare doser kan (om tillgängliga) administreras omväxlande i höger och vänster näsborre. Patienten ska övervakas medan akutsjukvård inväntas. Akutvård kan administrera ytterligare doser enligt lokala riktlinjer.	
Spolning av nål/infart, perifer ven	Natriumklorid inj 9mg/ml	3x10ml		