

Bilaga till rutin:

”Läkemedel med bestående toxisk effekt, skyddsinstruktioner”

Kategori 1.b.	Läkemedel i pulverform
Allmänt	Läkemedel i form av granulat minskar risken för exponering jämfört med pulver. Välj hellre läkemedel med mindre risk för allergi, för laxermedel t.ex. laktulos, lactitol.
Exempel på läkemedel som kan innebära risk vid hantering	Laxermedel av isphagula (Vi-Siblin). Antibiotika (Spektramox dospulver).
Risk	Allergirisk vid inandning, hudkontakt och/eller ögonkontakt.
Skyddsutrustning	Skyddshandskar (nitril, engångs), operationsmunskydd (engångs). Underlägg för att fånga eventuellt spill på bänk.
Arbetsätt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handdesinfektion. 2. Sätt på skyddsutrustning enligt ovan och arbeta på skyddsunderlägget. 3. Pulvret mäts upp och blandas i vätska (eller mat) enligt anvisning från fabrikant. 4. Sanering
Sanering	Tvätta av arbetsplatsen med vatten och därefter med ytdesinfektion. Vid hudkontakt , tag av förorenade kläder och tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt , spola med vatten. Vid inandning , frisk luft och kontakta läkare vid allergiska symtom.
Avfall	Handskar, plastat underlägg och munskydd läggs i plastpåse och försluts. Kastas därefter i gul avfallsbehållare för riskavfall (typgodkänt kärl enligt SkaS avfallsrutin).