

Bilaga till rutin:

”Läkemedel med bestående toxisk effekt, skyddsinstruktioner”

Kategori 5.	Inhalationsläkemedel
Allmänt	Med nebulisatorer finfördelas lösningar och suspensioner till aerosoler för inandning. Vid inhalationsbehandling med läkemedel och vid bronkiella provokationer finns risk för att sjukvårdspersonal andas in substans. <a href="#">Rutin för beställning av pentamidin.</a>
Exempel på läkemedel som kan medföra risk vid hantering	Histamin, Ribavarin, pentamidin
Risk	Inandning/dimma, hudkontakt, ögonkontakt. Inhalationsläkemedlen Ribavirin och Pentamidin har rapporterats kunna ge fosterskador.
Skyddsutrustning	Skyddshandskar (nitril, engångs), andningsskydd special/munskydd högrisk andningsskydd FFP3, skyddsrock. Vid inhalation av ribavarin och pentamidin ska det finnas riktat utsug i rummet som ska vara påslagen hela tiden tillredning, administrering och efterarbete pågår. Vid risk för stänk ska visir användas. Lämplig läkemedelsinhalator kan vara Airlife Misty Neb eller motsvarande. Skyddsrock ska bytas varje dygn och vid behov (t.ex. efter spill).
Arbetsätt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gör iordning nebulisator/inhalator.</li> <li>2. Handdesinfektion. Sätt på skyddsutrustning enligt ovan.</li> <li>3. Bred ut plastat underlägg och arbeta på detta.</li> <li>4. Iordningsställ läkemedlet.</li> <li>5. Administrera läkemedlet.</li> <li>6. Sanering.</li> </ol>
Sanering	Rengör nebulisator enligt anvisning. <b>Vid hudkontakt</b> , skölj med stora mängder vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. <b>Vid ögonkontakt</b> , skölj med stora mängder vatten eller koksaltlösning (15 min). Arbetsbänk rengörs först med vatten och därefter med ytdesinfektion. Visir ska rengöras vatten och diskmedel efter att arbete avslutats
Avfall	Handskar, plastat underlägg, övrigt material och andningsskydd läggs i plastpåse och försluts. Kastas därefter i gul avfallsbehållare för riskavfall (typgodkänt kärl enligt SkaS avfallsrutin).