

Patientinformation diabetesbehandling/operation hur du gör hemma:

Du får äta fram till 6 timmar före operationen.

Du får dricka klara drycker fram till 2
timmar före operationen.

Om du får insulinkänning skall du givetvis
dricka något sött, oavsett tidpunkt.

Kostbehandlad diabetes:

- Inga andra åtgärder.

Tabletter eller andra antidiabetika (till exempel Daonil, Mindiab, Glibenklamid, Glimepiride, Repaglinide, Metformin):

- Ta inte diabetestabletterna eller andra antidiabetika på morgonen. Tabletter som Jardiance, Forxiga, Invokana, Steglatro (SGLT2 hämmare): Gör uppehåll med dessa 3 dagar före operationen.

Insulinbehandling:

- Basinsulin: (Humulin NPH, Insulatard, Insuman basal, Lantus eller Levemir, Abasaglar)? Ta insulinet som vanligt både på kvällen innan operationen och/eller samma morgon beroende på när du vanligen tar dosen
- Snabbverkande måltidsinsulin (Lispro, Aspart, Fiasp, Actrapid, Apidra, Humalog eller Novorapid) på morgonen? Eftersom du inte äter frukost skall du inte ta något snabbverkande insulin på morgonen
- Blandinsulin (Humalog Mix eller Novomix) på morgonen? Ta inte insulinet på morgonen.

Insulinpump:

- Behåll insulinpumpen på men ta ingen bolusdos på morgonen.