

Bilaga 1 Riktlinje Akutask SkaS - läkemedel INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Etikett för hållbarhet

Ange datum för det läkemedel som har sämst hållbarhet

Tidskritiska läkemedel behöver förvaras på egen vårdenheter (ges inom 4 minuter, innan hjärtspark alternativt ambulans kommer).

Kriterier för urval av läkemedel:

- Läkemedel som behövs omgående i akut fas för anafylaxi, hypoglykemi, kramper, angina pectoris samt andningsdepression orsakad av opioider.
- Det ska vara lätt att göra rätt även för den som är ovan (både ordination och administrering), svårt att göra fel (orsaka vårdskada)
- Innehållet passar för patienter som kräver vuxendoser

Nedanstående anvisningar rekommenderas vara **Generella direktiv om läkemedelsbehandling** (go) på de enheter där medicinskt ansvarig läkare har godkänt användningen. Vid restsituationer och ny läkemedelsupphandling kan utbytbar läkemedel (enligt Läkemedelsverket) alternativt bedömts kliniskt likvärdiga och utbytbara på vårdenheter inom VGR (enligt Terapigrupp) väljas. Utbyte sker enligt SkaS rutin *Utbyte av ordinerade läkemedel - sjuksköterska och vårdfarmaceut*. Stryk, i dessa fall, över inaktuellt läkemedelsnamn på innehållsförteckningen samt notera namnet på det läkemedel som finns i lådan för tillfället. Datera och signera ändringen.

Indikation	Preparat	Mängd	Ordination / kontraindikation
Akutbehandling av svåra allergiska reaktioner (anafylaxi)	Epipen inj penna 300 mikrogram alternativt Emerade, Jext eller Anapen	2 st	Vuxna: Ge 1 autoinjektor 300 mikrogram Ge ytterligare en autoinjektor 300 mikrogram vid avsaknad av klinisk förbättring eller om försämring inträffar, 5-15 minuter efter den första injektionen. Epipen ska ges im på lårets utsida. Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen. Injektionen kan ges genom kläder.
Kupering av angina pectorisattack. Initial, symtomlindrande behandling vid misstanke på akut coronart syndrom respektive vid akut vänsterkammarsvikt	Nitrolingual sublingualspray 0,4 mg/dos	1 st (200 doser)	Vuxna: <i>Angina pectoris:</i> Doseringen är individuell och ska styras av det kliniska svaret. Spraya 1-2 doser (0,4-0,8 mg) på munslemhinnan under tungan medan patienten håller andan. Maximalt tre doser åt gången. Stäng munnen efter varje sprayning. <i>Akut hjärtinfarkt eller akut vänsterkammarsvikt:</i> 1-2 doser (0,4-0,8 mg) sprayas under kontinuerlig kontroll av det systoliska blodtrycket, som bör vara över 100 mm Hg. Uppnås ingen klinisk effekt kan samma dos ges efter 10 minuter.

Indikation	Preparat	Mängd	Ordnation / kontraindikation
Astma, bronkkonstriktion	Airomir (Autohaler) inhalationsspray 0,1 mg/dos	1 st (200 doser)	Vuxna: 1-2 doser för anfallskupering, max 16 inhalationer/dag
Epileptiska kramper	Midazolam inj 5 mg/ml	2 x 1 ml	Vuxna: Kan ges im eller iv. Dos: 5 mg (=1 ml) vid kramper istället för Stesolid, Diazepam. Kan upprepas en gång vid otillräcklig effekt. LJUSKÄNSLIG. Förvaras i mörk påse.
Hypoglykemi (insulinkoma).	Glukos Fresenius Kabi inj 300 mg/ml för iv användning	10x10 ml	Glukos Fresenius Kabi inj 300 mg/ml: Vuxna: Ca 1–1,5 ml injektionsvätska/kg kroppsvikt ges som iv injektion. Vid kortvarig akutillförsel kan lösningen ges i perifer ven. Extravasal injektion kan orsaka vävnadsskador. Om ingen effekt visas efter 5 min, skall ytterligare orsak till medvetslöshet misstänkas.
	alternativt Glucagon Novo Nordisk 1 mg förfylld spruta för im användning	1 st (1 mg)	Glucagon Novo Nordisk 1 mg: Vuxna: Dos: 1 mg injiceras im. Hållbarhet vid förvaring i rumstemperatur (25°C): upp till 18 månader. LJUSKÄNSLIG. Förvaras i originalförpackningen.
Upphävande av CNS-depressioner; framför allt andningsdepressioner, orsakad av opioider och partiella opioidagonister/-antagonister	Naloxon inj 0,4 mg/ml	1 x 1ml	Läkemedlet kan injiceras iv eller im. Vuxna: En iv injektion på 0,1-0,2 mg (0,25-0,5 ml) är i allmänhet tillräcklig. Äldre: Vid behandling av äldre patienter med kardiovaskulär sjukdom eller potentiellt kardiotoxisk medicinering ska Naloxon användas med försiktighet, eftersom allvarliga kardiovaskulära biverkningar, som ventrikulär takykardi och flimmer, observerats hos postoperativa patienter efter administrering av naloxonhydroklorid. LJUSKÄNSLIG. Förvaras i mörk påse.
Spolning av nål/infart, perifer ven	Natriumklorid inj 9mg/ml	3 x 10 ml	